

Een immediaat- prothese?



Het aanmeten van een immediaatprothese

Voor veel patiënten is het vaak een schok als de tandarts aangeeft dat het beter is om, naar aanleiding van tandheelkundige problemen, alle nog bestaande tanden en kiezen te trekken en een zogenaamde immediaat prothese te nemen. Hoewel er vaak veel problemen zijn en pijn is, is het voor veel patiënten een emotionele barrière om een prothese aan te laten meten. Wees gerust, al meer dan drie miljoen Nederlanders zijn drager van een volledige gebitsprothese.

Een immediaatprothese is een prothese die na het trekken van alle tanden en kiezen meteen in de mond wordt geplaatst. Voordeel hiervan is dat u nooit zonder tanden loopt. Nadeel is, dat vooral door het slinken van de kaak, de eerste tijd de pasvorm van deze prothese niet optimaal is.

Hoe is de procedure?

Aangezien elke mond en dus ook elke kaak anders is, moet een prothese altijd individueel worden gemaakt. Door de vorm en de stand van het eigen gebit zoveel mogelijk na te bootsen, zal een mooi cosmetisch resultaat behaald worden. Omdat dit zeer nauwkeurig werk is wordt de behandeling in verschillende fases uitgevoerd. Wel is het altijd zo dat de immediaatprothese helemaal klaar is voordat de tandarts over zal gaan tot het trekken van de tanden en kiezen. Nadat hij dit heeft gedaan, kan hij de prothese meteen in de mond plaatsen.

Gewenning

Wanneer de tanden en kiezen zijn getrokken en de prothese is geplaatst, gaat de kaak langzaam slinken. Het is normaal dat u in de eerste dagen na plaatsing last heeft van zogenaamde drukplaatsen. Dit zijn plaatsen in de prothese die tegen uw kaak drukken, waardoor u een pijnplekje voelt. Deze drukplaats kan bij de tandarts meteen worden verwijderd. Het slinken van de kaak wordt veroorzaakt doordat de ruimtes waar voorheen uw

tandwortels zaten, langzaam dichtgroeien. Vooral de eerste tijd na het trekken zult u dat merken doordat uw prothese losser komt te zitten. Na enkele weken is er de mogelijkheid om uw prothese te voorzien van een tijdelijk nieuw laagje, zodat de pasvorm weer veel beter is. Probeer wel altijd, ondanks bovengenoemde klachten, uw prothese zoveel mogelijk te dragen, zodat uw kaak mooi in de goede vorm geneest. Ook zult u hierdoor het snelst wennen aan het dragen van een gebitsprothese.

Verander of slijp zelf nooit aan de prothese, maar ga hiervoor altijd naar uw tandarts als u het idee hebt dat de prothese knelt of niet prettig zit.

Verzorging

Het is belangrijk dat de prothese op de juiste manier wordt onderhouden. Het is van groot belang om de eerste 24 uur na het trekken van de tanden en kiezen, de prothese niet uit de mond te halen. Dit omdat de wonden (ontstaan door het trekken van de tanden en kiezen) nog open zijn. Door het uitnemen van de prothese kunnen de wonden opnieuw gaan bloeden. Daarna is het belangrijk de prothese dagelijks goed te reinigen met een zogenaamde protheseborstel en warm water. Gebruik geen tandpasta, omdat dit schuurt in de prothese.



Praktijkstempel: