



SAMTYKKEERKLÆRING

Denne formular skal underskrives af TrioClear™-patienter før behandling. Tandlægen opbevarer den sammen med sin journal. Dette dokument må ikke deles med andre.

Ved at læse og underskrive denne formular erklærer patienten, at han/hun er velinformeret om behandling med TrioClear™ aligners.

Din tandlæge har anbefalet TrioClear™-systemet til din ortodontiske behandling. Selvom tandregulering kan føre til et sundere og smukkere smil, skal du også være opmærksom på, at enhver tandreguleringsbehandling (herunder behandling med TrioClear™ aligners) har begrænsninger og potentielle risici som du bør overveje, før du går i gang med behandlingen. Resultaterne kan variere, og simuleringen er kun en omtrentlig retningslinje.

TRIOCLEAR™ BESKRIVELSE

TrioClear™-skinnerne, der er udviklet af Perfection Aligner System Hong Kong Limited, består af en række aftagelige skinner af klar plast, der flytter tænderne i små trin. TrioClear™-produktet kombinerer din tandlæges diagnose med avanceret computergrafikteknologi for at skabe en behandlingsplan, der specificerer de ønskede bevægelser af dine tænder i løbet af din behandling. Når din tandlæge har godkendt behandlingsplanen, fremstilles en række skræddersyede TrioClear™-skinner.

PROCEDURE

Du vil gennemgå en ortodontisk undersøgelse forud for behandlingen. Din tandlæge vil tage aftryk eller intra-orale scanninger af dine tænder samt røntgenbilleder og kliniske fotos og sende disse data til TrioClear™-laboratoriet. TrioClear™-teknikere vil derefter skabe en softwaremodel af din ordinerede behandlingsplan. Når din tandlæge har godkendt behandlingsplanen, producerer og sender TrioClear™ en række skræddersyede skinner til din tandlæge. Det samlede antal aligners vil variere afhængigt af kompleksiteten af din tandregulering og tandlægens behandlingsplan. Skinnerne nummereres individuelt og udleveres til dig af din tandlæge med specifikke brugsanvisninger.

Medmindre din tandlæge har sagt andet, skal du have dine skinner på i ca. 22 timer om dagen, som anbefalet af din behandler, og kun tage dem af for at spise, børste tænder og bruge tandtråd. Skift til den næste aligner i serien som anvist. Behandlingens varighed varierer afhængigt af behandlingens kompleksitet. Medmindre du får andre instrukser, bør du planlægge en opfølgingsaftale med din behandler mindst hver 6. til 8. uge. De fleste patienter har brug for ekstra apparatur og/eller brug af elastikker under behandlingen for at lette specifikke ortodontiske bevægelser. Patienter kan have brug for yderligere aftryk eller intraorale scanninger og/eller forbedringsskinner efter det første sæt skinner.



FORDELE

- TrioClear™-bøjler er et æstetisk alternativ til konventionelle tandbøjler.
- Aligners er næsten usynlige, så mange mennesker vil ikke bemærke, at du følger en behandling. Behandlingsplaner kan visualiseres ved hjælp af behandlingsplanlægningssoftware.
- Aligners tillader normal tandbørstning og brug af tandtråd, hvilket normalt ikke er muligt med konventionelle bøjler.
- Aligners har ikke de metaltråde eller -bøjler, der følger med konventionelle bøjler.
- Brug af skinner kan forbedre mundhygiejnen under behandlingen.
- TrioClear™-patienter kan opleve forbedret parodontal (tandkøds) sundhed efter behandlingen.

RISICI OG ULEMPER

Ligesom andre tandreguleringsbehandlinger kan brugen af TrioClear™-skinner indebære nogle af de risici, der er beskrevet nedenfor:

1. Hvis du ikke bærer skinnerne det krævede antal timer om dagen, hvis du ikke bruger skinnerne i henhold til din tandlæges anvisninger, hvis du udebliver fra aftaler, og hvis tænderne bryder frem eller har en atypisk form, kan det forlænge behandlingstiden, forringe evnen til at opnå de ønskede resultater og øge behandlingsomkostningerne. Slutresultatet af simuleringen stemmer måske ikke overens med det kliniske slutresultat;
2. Tænderne kan føles midlertidigt følsomme efter skift til den næste skinne i serien;
3. Tandkød, kinder og læber kan blive irriterede, hvis man ikke har en god mundhygiejne;
4. Tænderne kan have tendens til langsomt at vende tilbage til den gamle position efter behandlingen. Derfor er det vigtigt at bære skinnen konsekvent efter behandlingen for at forhindre dette;
5. Skinnerne kan midlertidigt påvirke talen og kan resultere i læsp, men enhver taleforstyrrelse forårsaget af TrioClear™-produkterne bør forsvinde i løbet af en eller to uger;
6. Aligners kan forårsage en midlertidig stigning i spytksekretion eller mundtørhed, og visse medikamenter kan forstærke denne effekt;
7. Under behandlingen kan der sættes attachments på en eller flere tænder for at forbedre tandbevægelsen og/eller apparatets retention. Disse fjernes ved behandlingens afslutning;
8. Disse attachments kan nogle gange løsne sig. I tilfælde af tab er det vigtigt at konsultere tandlægen så hurtigt som muligt;
9. Interproximale tænder skal måske rekontureres eller stripes for at skabe den nødvendige plads til tandjustering;
10. Biddet kan ændre sig i løbet af behandlingen og kan medføre midlertidigt ubehag for patienten;
11. I sjældne tilfælde kan der opstå let overfladeslid på aligneren, hvor patienten skærer tænder, eller hvor tænderne gnider mod hinanden. Det er generelt ikke et problem, da skinnernes overordnede integritet og styrke forbliver intakt;
12. I slutningen af tandreguleringsbehandlingen kan det være nødvendigt at justere biddet („okklusal justering“);
13. Atypisk formede, frembrudte og/eller manglende tænder kan påvirke skinnenes tilpasning og evnen til at opnå de ønskede resultater;
14. Behandling af et alvorligt åbent bid, alvorligt overbid, alternativt tandsæt og/eller en skeletmæssigt smal kæbe kan kræve yderligere behandling ud over aligner-behandling;
15. Yderligere ortodontisk behandling, herunder brug af knapper, ortodontiske elastikker, hjælpeapparater/tandapparater (f.eks. midlertidige forankringsapparater, sektionsopdelte faste apparater) og/eller genoprettende tandbehandlinger kan være påkrævet for mere komplicerede gebehandlingsplaner, hvor aligners alene ikke er tilstrækkelige til at opnå det ønskede resultat;

16. I tænder, der har overlappet hinanden i lang tid, kan tandkødet under den interproximale kontakt mangle, når tænderne er justeret, hvilket skaber en „sort trekant“; Disse kan elimineres i efterbehandling;
-
17. Generelle medicinske tilstande og brug af medicin kan påvirke ortodontisk behandling;
-
18. Eksisterende tandrestaurationer (f.eks. kroner) kan løsne sig og skal cementeres igen eller i nogle tilfælde udskiftes;
-
19. Korte kliniske kroner kan gøre det vanskeligt at fastgøre apparaturet og muligvis forhindre tænderne i at bevæge sig;
-
20. Alignerfraktur er mere sandsynligt hos patienter med alvorlig skævhed og/eller flere manglende tænder;
-
21. Hvis du har allergier, bedes du fortælle det til din behandler;
-
22. Tænder, der ikke i det mindste er delvist dækket af skinnen, kan vokse ud;
-
23. Efterhånden som de tredje molarer (visdomstænder) udvikler sig, kan dine tænder ændre position. Din tandlæge og/eller tandreguleringspecialist bør overvåge dem for at afgøre, hvornår og om de tredje molarer skal fjernes;
-
24. Under behandlingen kan det være nødvendigt at gå tilbage til tidligere alignersæt, så det er vigtigt at opbevare alle tidligere anvendte aligners, indtil behandlingen er afsluttet.
-

RETENTION

Efter endt behandling anbefaler vi brug af retainere for at undgå tilbagefald til den oprindelige position. Din tandlæge vil diskutere og ordinere den mest passende retentionsprotokol til dig. Det kan være en tråd, aftagelige skinner eller en kombination af begge. Vi anbefaler „Ecodont™ Retainer“, hvis du får ordineret den aftagelige løsning. „Ecodont™ Retainer“ består af et sæt med to retainere til hver tandbue og kan købes mod et tillæg. Retainerne skal bæres i lange perioder for at forhindre dine tænder i at flytte sig og skal udskiftes fra tid til anden, når de slides, blødgøres eller går i stykker, afhængigt af hvordan du håndterer dem og dine tandplejevaner.

Fornavn: _____

Efternavn: _____

Adresse: _____

Postnummer: _____

Sted: _____

Fødselsdato: --

Dato: --20

Underskrift*: _____

**Hvis underskriveren er under 18 år, skal forældrene eller værgeren også underskrive for at acceptere.*